



Con el menor tiempo de espera del mercado:

- en carne de ovino 21 días
- en carne de bovino 18 días
- en leche de bovino 3 días



Bimoxyl LA 150 mg/ml

Amoxicilina en suspensión inyectable



Bimoxyl LA es actualmente la amoxicilina en suspensión inyectable comercializada en España con menor tiempo de espera en carne de ovino (21 días), carne de bovino (18 días) y en leche de bovino (3 días).




- ✓ Cobertura antibiótica de amplio espectro.
- ✓ Excelente suspensión y jeringabilidad.
- ✓ Actividad prolongada durante 48 horas.
- ✓ Bien tolerada en bovino, ovino y porcino.

LABIANA
siempre eficaz

Bimoxyl LA 150 mg/ml Amoxicilina en suspensión inyectable



Periodos de retirada

	 Bovino	 Ovino	 Porcino
CARNE	18 días	21 días El más corto del mercado	21 días
LECHE	72 horas	Uso no autorizado en ovino cuya leche se utiliza para consumo humano	-

COMPOSICIÓN POR ML

Amoxicilina..... 150 mg

INDICACIONES

Bovino:

Tratamiento de infecciones respiratorias y otras infecciones causadas solamente por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a amoxicilina.

Ovino y porcino:

Tratamiento de enfermedades infecciosas en porcino y ovino, causadas por o asociadas con bacterias sensibles a amoxicilina.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino, ovino y porcino:

15 mg de amoxicilina por kg p.v., (equivalente a 1 ml / 10 kg p.v. de Bimoxyl LA) vía intramuscular.

El volumen máximo a administrar en cada punto de inyección es de: 20 ml en bovino, 4 ml en ovino y 5 ml en porcino. Volúmenes mayores deben ser divididos y administrados en diferentes puntos.

TIEMPO DE ESPERA

Bovino:

Carne: 18 días.

Leche: 72 horas.

Ovino:

Carne: 21 días.

Porcino:

Carne: 21 días.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar por vía intravenosa o intratecal.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

PRECAUCIONES Y REACCIONES ADVERSAS

El volumen máximo a administrar en cada punto de inyección es de: 20 ml en bovino, 4 ml en ovino y 5 ml en porcino. Volúmenes mayores deben ser divididos y administrados en diferentes puntos.

Ocasionalmente, puede producirse una reacción local transitoria en el punto de inyección.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación.

PRESENTACIONES

Vial de 250 ml.

Registro nº: 3533 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

