

La dihidroestreptomicina  
inyectable  
más concentrada  
con registro en porcino  
del mercado



## Estreptolab 250 mg/ml

Estreptomicina en solución inyectable



### Activo frente a infecciones por leptospiras

- ✓ 85% de granjas son positivas a leptospiras
- ✓ Un problema creciente por los sistemas de explotación de las reproductoras en parques
- ✓ Se trata de una **zoonosis**

### Evita la existencia de camadas cortas

- ✓ Uno de los efectos perjudiciales de la leptospirosis

### Mejora la fertilidad de la granja

- ✓ Inyectar las cerdas en el destete y los verracos cada 6 meses


**LABIANA**  
*siempre eficaz*



## Patogenia y síntomas de la leptospirosis porcina

### ENTRADA DE LA INFECCIÓN

- Introducción de primerizas y verracos infectados.
- Por otros animales: ratas, ratones y perros pueden actuar como reservorios de la infección.
- Exposición de la granja a fuentes indirectas de contaminación, por ejemplo: agua contaminada, suelos en mal estado que permiten que la orina forme charcos.



### SINTOMATOLOGÍA

#### Cerdas

- Inapetencia.
- Fiebre.
- Puede observarse depresión.
- Abortos en el tercer trimestre.
- Aumento de lechones momificados.
- Aumento de lechones débiles, no viables.
- Aumento de lechones prematuros.
- Aumento de lechones nacidos muertos.
- Aumento de repeticiones en cerdas reproductoras.

#### Transición y cebo

- Ictericia aguda.
- Hemorragia.
- Muerte súbita.
- Animales pálidos.

### COMPOSICIÓN POR ML

Dihidroestreptomina (sulfato) ..... 250 mg

### INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por cepas de *Leptospira* spp. sensibles a dihidroestreptomina.

### POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 ml/10 kg p.v. por día, durante 3-4 días por vía IM.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor precisión posible para evitar una dosificación insuficiente.

No administrar más de 7 ml en porcino por lugar de inyección.

Prever una separación suficiente entre los puntos de inyección cuando sean necesarios varios lugares de administración. Asegúrese de mantener una distancia mínima de 15 cm entre todas las inyecciones administradas como parte del tratamiento.

### TIEMPO DE ESPERA

**Porcino:**

**Carne:** 73 días.

### PRECAUCIONES Y REACCIONES ADVERSAS

- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la dihidroestreptomina, a otros aminoglicósidos y/o algún excipiente.
- No usar en caso de insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o lesiones cocleovestibulares.
- No usar en animales menores de un mes.
- No administrar en hembras gestantes, por existir riesgo de toxicidad cocleovestibular fetal.
- No administrar conjuntamente con: antibióticos bacteriostáticos, pentobarbital y anestésicos inhalatorios (por existir riesgo de depresión vascular), relajantes musculares (por riesgo de bloqueo neuromuscular) ni diuréticos renales (por riesgo de aumentar la ototoxicidad).
- Tampoco administrar con: heparina, gluconato cálcico, riboflavina ni triamcinolona.

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

### PRESENTACIÓN

Vial de 250 ml.

Registro nº 3590 ESP

*Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.*

*Administración bajo control o supervisión del veterinario.*