

80 mg/ml

Concentración



Gentasol

Gentamicina en solución inyectable



Tratamiento de infecciones en vacuno

- ✓ Infecciones del tracto respiratorio
- ✓ Para vacas con metritis y endometritis
- ✓ Para infecciones digestivas por *Coli* y *Salmonella*

Excelente absorción y rapidez de acción

- ✓ Alcanza la concentración máxima en 30-60 minutos


La gentamicina inyectable mejor valorada del mercado español

- ✓ Avalada por nuestros clientes por su alta calidad

LABIANA
siempre eficaz



Mecanismo de acción de la gentamicina



COMPOSICIÓN POR ML

Gentamicina (sulfato) 80.000 UI

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina.

Terneros (de hasta 250 kg):

- Colibacilosis y salmonelosis.
- Infecciones genitourinarias.
- Infecciones del tracto respiratorio.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino (terneros de hasta 250 kg): Vía intramuscular o intravenosa lenta. Dosis de 2000 - 5000 U.I. de gentamicina/kg p.v. cada 8 - 12 horas (equivalente a 2,5 - 6,2 ml/100 kg) durante 3 días consecutivos. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 20 ml.

Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 20 ml.

TIEMPO DE ESPERA

Terneros:

Carne: 214 días.

Leche: No administrar a hembras en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en casos conocidos de disfunción renal.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No exceder la posología recomendada.
- No usar en hembras gestantes.
- No usar en animales deshidratados o con alteración de la audición (pérdida de equilibrio u oído interno dañado).
- No se recomienda utilizar la gentamicina en potros y neonatos.

PRESENTACIONES

Viales de 100 y 250 ml.

Registro nº 638 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.