



Rápida absorción
tras administración oral



Kin-O-Flox 100 mg/ml

Enrofloxacin en solución oral
para administración en agua de bebida



Tratamiento eficaz de infecciones respiratorias y digestivas

- ✓ Infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum* y *Pasteurella multocida*

Alta calidad de fabricación

- ✓ Filtración por malla filtrante

Fórmula soluble

- ✓ El enrofloxacin se absorbe rápidamente tras la administración oral

LABIANA
siempre eficaz


Kin-O-Flox 100 mg/ml **Enrofloxacin** en solución oral para administración en agua de bebida



Mecanismo de acción del enrofloxacin

Inhibición de la ADN Girasa

El ADN bacteriano no puede realizar la rotación axial negativa necesaria para la replicación del material genético y para la transcripción. También actúa sobre la permeabilidad de la pared celular. Con estos dos mecanismos la bacteria expuesta al enrofloxacin pierde rápidamente su viabilidad.



COMPOSICIÓN POR ML

Enrofloxacin 100 mg

INDICACIONES

Aves (pollos de engorde).

Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al enrofloxacin:

- *Mycoplasma gallisepticum*
- *Mycoplasma synoviae*
- *Avibacterium paragallinarum*
- *Pasteurella multocida*

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

0,1 ml /kg p.v./día durante 3-5 días consecutivos.

El agua medicada debe prepararse cada 24 horas, inmediatamente antes de iniciar el tratamiento. El agua medicada debe ser la única fuente de agua durante todo el tratamiento.

Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y en procesos crónicos. Si no se observa mejoría clínica a los 2-3 días, deberá reconsiderarse el tratamiento en base a tests de sensibilidad.

Según la dosis recomendada, el número y el peso de los animales que deben recibir tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamento aplicando la fórmula siguiente:

$$\frac{10 \text{ mg/kg/día} \times \text{peso medio de animales}}{100 \text{ mg/ml} \times \text{consumo medio de agua (litros/día)}} = \text{ml de medicamento / litro de agua}$$

TIEMPO DE ESPERA

Pollos (carne): 7 días.

Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

CONTRAINDICACIONES

- No usar para profilaxis.
- No usar en caso de que se haya identificado la existencia de resistencia o resistencia cruzada a las (fluoro)quinolonas en el grupo de aves a tratar.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, otras (fluoro)quinolonas o a algún excipiente.

PRECAUCIONES

Las fluoroquinolonas deben reservarse para el tratamiento de cuadros clínicos que hayan respondido mal o que previsiblemente responderán mal a otros grupos de antimicrobianos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Periodo de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato.

Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 24 horas.

PRESENTACIONES

Botella de 1 litro.

Garrafa de 5 litros.

Registro nº 1110 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

