



Alta
concentración



Labhidro® AD3E

Solución inyectable

Tratamiento y prevención de deficiencia de vitaminas A, D3 y E

- ✓ Vitamina A: esencial para el crecimiento y la reproducción
- ✓ Vitamina D3: interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo
- ✓ Vitamina E: tiene actividad antioxidante

La fórmula más concentrada del mercado

- ✓ Cada ml contiene 500.000 UI de Vitamina A, 75.000 UI de Vitamina D3 y 50 mg de Vitamina E
- ✓ Fórmula no acuosa

Cero días de tiempo de espera en leche



LABIANA
Siempre eficaz



Propiedades farmacodinámicas



Vitamina A (propionato de retinol)

Esencial para el crecimiento, la reproducción y el funcionamiento de la mayoría de los órganos; ayuda a mantener la integridad de los tejidos epiteliales.



Vitamina D3 (colecalfiferol)

Interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, incrementando la absorción intestinal y tubular del calcio, siendo además necesaria para la mineralización apropiada de la matriz cartilaginosa que se desarrolla en la epífisis óseas.



Vitamina E (acetato de todo-rac- α -tocoferilo)

Tiene actividad antioxidante, evita la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas, impidiendo la formación de radicales libres y de peróxidos que son causa de degeneración y destrucción celular.

COMPOSICIÓN POR ML

Vitamina A (propionato de retinol)	500.000 UI
Colecalciferol (vitamina D3)	75.000 UI
Acetato de todo-rac- α -tocoferilo (vitamina E)	50 mg

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de deficiencias en vitamina A, D3 y E.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular

Bovino: 1-5 ml de medicamento/animal/en dosis única

Vitamina A	500.000 - 2.500.000 UI
Vitamina D3	75.500 - 375.000 UI
Vitamina E	50 - 250 mg

Ovino: 0,5-2 ml de medicamento/animal/ en dosis única

Vitamina A	250.000 - 1.000.000 UI
Vitamina D3	37.500 - 150.000 UI
Vitamina E	25 - 100 mg

Caballos: 1-5 ml de medicamento/animal/ en dosis única

Vitamina A	500.000 - 2.500.000 UI
Vitamina D3	75.500 - 375.000 UI
Vitamina E	50 - 250 mg

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.

Leche: Cero días

CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes.

REACCIONES ADVERSAS

- En muy raras ocasiones pueden producirse reacciones alérgicas. Si esto ocurre, administrar inmediatamente epinefrina y/o antihistamínicos inyectables.
- Si no se aplica correctamente pueden producirse abscesos en el punto de inyección.
- En muy raras ocasiones puede aparecer una pequeña reacción local en el punto de inyección, que desaparece después de un tiempo breve.

PERIODO DE VALIDEZ

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 18 meses.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

PRESENTACIÓN

Vial de 25 ml, 50 ml, 100 ml.

Registro nº: 3668 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.