



Inducción al parto



Labipituin®

Oxitocina en solución inyectable



Hormona de elección en obstetricia

- ✓ Inducción al parto
- ✓ En caso de inercia o atonía del útero
- ✓ Ayuda a la expulsión de secundinas
- ✓ Provoca la expulsión de exudados en casos de piometritis y endometritis

Acción sobre la lactación

- ✓ Iniciación a la lactación tras el parto
- ✓ Indicado como coadyuvante en los tratamientos de mastitis para facilitar el drenaje

LABIANA
siempre eficaz

Labipituin® Oxitocina en solución inyectable



La oxitocina estimula selectivamente la actividad motora del útero y de las células mioepiteliales mamarias

COMPOSICIÓN POR ML
Oxitocina 10 UI

INDICACIONES
Vacas:

- Inducción al parto.
- Inercia o atonía uterina.
- Involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias.
- Expulsión de secundinas y restos de exudados tras el parto.
- Iniciación a la lactación tras el parto.
- Piometritis y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados.
- Tratamiento coadyuvante a la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Obstetricia (vías intravenosa, intramuscular, subcutánea):

- **Vacas:** 75-100 UI (equivalente a 7,5-10 ml).

Eyección láctea (preferiblemente vía intravenosa):

- **Vacas:** 10-20 UI (equivalente a 1-2 ml).

La administración puede repetirse cada 30 minutos, si el veterinario lo considera necesario.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: cero días.
Leche: cero días.

CONTRAINDICACIONES
No usar en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- Distocia por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Hembras con predisposición a ruptura uterina.
- Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
La inyección intravenosa debe ser muy lenta, y preferentemente con suero glucosado o salino.
Administrar con precaución en toxemias.
Pueden producirse reacciones alérgicas.
No utilizar en hembras en gestación hasta el momento del parto.
Los corticoides, vasoconstrictores simpaticomiméticos y anestésicos pueden potenciar sus efectos, al igual que el calcio, los estrógenos y las prostaglandinas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz.

PRESENTACIONES
Viales de 25, 100 y 250 ml.

Registro nº 585 ESP
*Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.*

