



**+  
MÁS  
Ketoprofeno**

**15%**

**ME-  
NOS  
tiempo de  
retirada**

**Labiprofen<sup>®</sup>**  
150 mg/ml

**LABIANA**  
*siempre eficaz*



Administración bajo control o supervisión del veterinario.



## Beneficios de un AINE con mayor concentración de Ketoprofeno

KETOPROFENO		15%			VS.	10%		
DOSIFICACIÓN								
		1 ml/50 kg p.v./día	1 ml/50 kg p.v./día	0,75 ml/50 kg p.v./día		1 ml/33 kg p.v./día	1 ml/33 kg p.v./día	1 ml/45 kg p.v./día
PERIODO DE RETIRADA								
	Carne y vísceras	2 días	3 días	1 día		4 días	4 días	4 días
	Leche	0 horas	-	No autorizado		0 horas	-	No autorizado

### COMPOSICIÓN POR ML

Ketoprofeno ..... 150 mg  
Alcohol bencílico ..... 10 mg

### INDICACIONES

#### Bovino:

- Reducción de la inflamación y del dolor después del parto, los trastornos musculoesqueléticos y la cojera.
- Reducción de la fiebre asociada con la enfermedad respiratoria bovina en combinación con terapia antimicrobiana cuando sea apropiado.
- Reducción de la inflamación, fiebre y dolor en mastitis clínica aguda en combinación con terapia antimicrobiana cuando sea apropiado.

#### Porcino:

- Reducción de la fiebre en casos de enfermedad respiratoria y Síndrome de Disgalaxia Postparto –SDPP (síndrome de Metritis Mastitis Agalaxia) en cerdas, en combinación con tratamiento antiinfeccioso, cuando proceda.

#### Caballo:

- Reducción de la inflamación y el dolor asociados con trastornos osteoarticulares y musculoesqueléticos (cojera, laminitis, osteoartritis, sinovitis, tendinitis, etc.).
- Reducción del dolor e inflamación postoperatorios.
- Reducción del dolor visceral asociado con cólico.

### POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

- Bovino:** 1 ml de medicamento por 50 kg de p.v./día durante 1-3 días vía IV o IM, preferiblemente en la región del cuello.
- Porcino:** 1 ml de medicamento por cada 50 kg de p.v./día vía IM en una sola ocasión. El tratamiento puede repetirse a intervalos de 24 horas durante un máximo de tres tratamientos. Cada inyección debe administrarse en un lugar distinto.
- Caballos:** 0,75 ml de medicamento por 50 kg de p.v./día vía IV durante 1-5 días. En el caso de los cólicos una inyección normalmente es suficiente.

### TIEMPO DE ESPERA

#### Carne:

Bovino: 2 días  
Porcino: 3 días  
Caballos: 1 día

#### Leche:

Bovino: cero horas

### CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales en los que exista la posibilidad de ulceración o hemorragia gastrointestinal a fin de no agravar su estado.
- No usar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida al ketoprofeno, al ácido acetilsalicílico o a algún excipiente.
- No usar en animales con evidencia de discrasia sanguínea o coagulopatía.
- No utilice otros medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) al mismo tiempo o con 24 horas de diferencia

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- No superar la dosis ni la duración del tratamiento recomendado.
- No está recomendado en potros de menos de un mes de edad.
- En animales de menos de 6 semanas de edad, ponis o en animales de edad avanzada ajustar la dosis con exactitud.
- Evitar la inyección intra-arterial.
- Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un riesgo potencial de aumento de la toxicidad renal.
- No está recomendado el uso de ketoprofeno en cerdos afectados por PMWS (síndrome multisistémico del adelgazamiento post-destete), a fin de no agravar su estado.
- En caballos, evitar la administración extravascular.

### USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA

- Puede ser utilizado en vacas gestantes y en vacas y cerdas en lactación.
- Su uso no está recomendado en yeguas en lactación.

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

- Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

### PRESENTACIONES

Viales de 50, 100 y 250 ml  
Registro nº 3966 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.