AINE de elección



Recocam 20mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y caballos

Beneficios:

- Bajos volúmenes de inyección
- AINE de larga duración
- Cortos tiempos de espera
- Selectivo de la COX 2: efectos adversos reducidos
- Uso multiespecie: para bovino, porcino y caballos
- Múltiples indicaciones
- Excelentes resultados frente a la mastitis-metritis-agalaxia en porcino

LABIANA
siempre eficaz

Recocam 20mg/ml Solución inyectable para bovino, porcino y caballos

COMPOSICIÓN POR ML
Meloxicam.....20 mg

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino y caballos.

INDICACIONES
Bovino

En infecciones respiratorias agudas con terapia antibiótica adecuada, para reducir los síntomas clínicos en bovino.

En diarrea en combinación con terapia rehidratante oral para reducir los síntomas clínicos en terneros de más de una semana y en bovinos jóvenes que no se encuentren en lactación.

Como terapia auxiliar en el tratamiento de la mastitis aguda, en combinación con terapia antibiótica.

Porcino

En trastornos no infecciosos del aparato locomotor para reducir los síntomas de cojera e inflamación.

Como terapia auxiliar en el tratamiento de la septicemia puerperal y la toxemia (mastitis-metritis-agalaxia) con la terapia antibiótica apropiada.

Caballos

Para reducir la inflamación y aliviar el dolor en trastornos musculoesqueléticos agudos y crónicos. Para aliviar el dolor asociado al cólico equino.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovino:

Inyección subcutánea o intravenosa de una única dosis de 0,5 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 2,5 ml/100 kg peso vivo) en asociación con terapia antibiótica o con terapia rehidratante oral, según se considere adecuado.

Porcino:

Inyección intramuscular de una única dosis de 0,4 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 2,0 ml/100 kg peso vivo) en combinación terapia antibiótica, según se considere adecuado. En caso necesario, se puede administrar una segunda dosis de meloxicam al cabo de 24 horas.

Caballos:

Inyección intravenosa de una única dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 3,0 ml/100 kg peso vivo).

Para la reducción de la inflamación y para aliviar el dolor tanto en los trastornos musculoesqueléticos agudos como crónicos, pueden emplearse las suspensiones orales de meloxicam para la continuación del tratamiento a una dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg de peso vivo, 24 horas después de la administración de la inyección.

CONTRAINDICACIONES
- No usar en caballos de menos de 6 semanas.
- No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos, o en caso de que exista evidencia de lesiones gastrointestinales ulcerogénicas.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- Para el tratamiento de la diarrea en bovino, no usar animales de menos de una semana.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA
Bovino y porcino:

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

Caballos:

No usar en animales durante la gestación ni la lactancia.

TIEMPOS DE ESPERA
Bovino:

Carne: 15 días

Leche: 5 días

Porcino:

Carne: 5 días

Caballos:

Carne: 5 días

No debe usarse en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
El meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) del grupo de las oxicamas que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, antiexudativos, analgésicos y antipiréticos. Reduce la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado. En menor grado, inhibe también la agregación de trombocitos inducida por el colágeno. El meloxicam también tiene propiedades antiendotóxicas ya que ha demostrado inhibir la producción de tromboxano B2 inducido por la administración de endotoxina de *E. coli* en terneros y cerdos.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml

PERÍODO DE VALIDEZ
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años.

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
EU/2/11/133/001-003

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Bimeda Animal Health Limited,
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24,
Irlanda.
Tel.: +353 (0)1 4515011

REPRESENTANTE DEL TITULAR
Labiana Life Sciences S.A.
C/ Venus, 26
08228 Terrassa (Barcelona)
España
Tel.: +34 937 36 97 00

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

LABIANA
siempre eficaz

Junio 2020