



Rumilab®

Pienso complementario dietético de uso veterinario

Inidicado para las indigestiones

- Reduce el riesgo de acidosis
- Reduce el riesgo de cetosis
- ✓ Indicado para la atonía ruminal
- Tratamiento frente a la anorexia

Acción más rápida

- Elevada concentración por toma
- Fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales
- Aporta materias primas para el mantenimiento de la flora ruminal adecuada

Conveniencia de uso

- Envase con dos sobres
- Un tratamiento para cada animal

LABIANA

 Máxima eficacia en tratamientos combinados con Rumintral






Rumilab[®] Pienso complementario dietético de uso veterinario



Desarrollo del cuadro de acidosis en rumiantes



COMPOSICIÓN

Fosfato dicálcico, levadura de cerveza, caseína, cloruro de sodio, glicerol (4,64 g/kg). Aditivos (por bolsa de 175 g):

Vitaminas

vitariirias.	
Vitamina B2 (3a825i)	50 mg
Niacinamida (3a315)	
Vitamina B1 (3a820)	15,4 mg
Aminoácidos:	
DL-Metionina, técnicamente pura (3c301)	3 g
Oligoelementos:	
Óxido de manganeso (II) (3b502)	
Sulfato de zinc heptahidratado (3b604)	10 mg
Conservantes:	
Propionato sódico (E 281)	47,6 g
Propionato cálcico (E 282)	30 g
Estabilizantes:	
Celulosa microcristalina (E 460)	3 g
Ligantes:	
Mezclas naturales de esteatitas y clorita (E 560)	
Sílica coloidal (E551b)	2 g
Silicato cálcico sintético (E552)	2 g
Emulgentes:	
Ricinoleato de gliceril polietilenglicol (E484)	24,8 mg

INDICACIONES

Vacas lecheras y terneros

- Reducción del riesgo de acidosis, periodo de utilización recomendado: 2 meses
- Especialmente indicado para vacas lecheras de alto rendimiento y para terneros de engorde intensivo.

- Reducción de riesgo de cetosis en vacas lecheras.
- También es una fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Reducción del riesgo de cetosis:

Vacas lecheras:

1 bolsa (175 g), 1 o 2 veces al día o 1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días.

Reducción del riesgo de acidosis:

Vacas lecheras: 1 bolsa (175 g) 1 o 2 veces/día o 1/2 bolsa (87,5 g)/día durante 2-3 días.

Terneros: 1/2 bolsa (87,5 g) 1 o 2 veces/día o 1/4 bolsa (43,75 g)/día durante 2-3 días.

Vía oral, en el alimento.

Incorporar las dosis indicadas a 1 kg de alimento por una bolsa de preparado, o en 1/2 kg de alimento a otras dosis.

Consultar la opinión de un veterinario antes de usarlo o antes de extender el periodo de uso.

TIEMPO DE ESPERA

No requiere.

PRECAUCIONES DE USO

Vacas lecheras: 3 a 6 semanas después del parto.

PRESENTACIÓN

Estuche de 2 sobres de 175 g cada uno.

αFSP-08100341

