



Única neostigmina
inyectable del mercado



Rumintral

Neostigmina en solución inyectable



Producto de elección en timpanismo y atonía gastrointestinal

- ✓ Tratamiento de la sobrecarga ruminal, atonía gastrointestinal y cuadros de meteorismo
- ✓ Posee efectos sobre el aparato respiratorio, aumentando la actividad ciliar y las secreciones bronquiales

Indispensable en el botiquín veterinario


- ✓ Máxima eficacia en tratamientos combinados con Rumilab®

 **LABIANA**
siempre eficaz

Rumintral Neostigmina en solución inyectable



Mecanismo de acción de la neostigmina



COMPOSICIÓN POR ML

Neostigmina metilsulfato 1,5 mg

INDICACIONES

Bovino:

- Atonía rumial.
- Atonía intestinal.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

0,022 mg/kg p.v. (equivalente a 0,15 ml/10 kg p.v. de Rumintral) por vía subcutánea o intramuscular.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA

No administrar a hembras en gestación ni en lactación.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en casos de obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal o urinario.
- No administrar junto con otros inhibidores de la colinesterasa, ni con bloqueantes neuromusculares despolarizantes (succinilcolina).

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los propios de la hipoactividad colinérgica.

SOBREDOSIFICACIÓN

Marcada debilidad muscular, vómitos, cólico, diarrea, miosis, disnea, bradicardia, hipotensión. La muerte se produce por fallo respiratorio.

Antídoto: Atropina.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar y al abrigo de la luz.

PRESENTACIÓN

Vial de 25 ml.

Registro nº 891 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

