

Rápida
acción



Termolab 600 mg/g

Ácido acetilsalicílico en polvo para agua de bebida



Efectos beneficiosos en casos de fiebre moderada

- ✓ Mejora el estado general de los cerdos
- ✓ Reduce la temperatura y la inflamación de los tejidos
- ✓ Los animales vuelven más rápidamente a consumir alimento

Elevada eficacia antipirética

- ✓ Efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos
- ✓ Elevada y rápida capacidad de absorción


Conveniencia de uso

- ✓ Administrado en agua de bebida

LABIANA
siempre eficaz



Cascada inflamatoria



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Ácido acetilsalicílico.....600 mg

INDICACIONES

Porcino: Tratamiento sintomático para reducir la pirexia moderada (inferior a 41,5 °C) en el contexto de enfermedades infecciosas, en combinación con una terapia antiinfecciosa apropiada. Para temperaturas más elevadas, el medicamento a la dosis indicada no ha demostrado su eficacia.

POSOLOGÍA

Administrar por vía oral, disuelto en el agua de bebida.

Dosis: 21 mg de ácido acetilsalicílico por kg p.v. (equivalentes a 35 mg de Termolab por kg p.v.) cada 12 h hasta remisión de la fiebre o un máximo de 5 días consecutivos.

Para el cálculo de la cantidad en gramos de Termolab que debe incorporarse por cada litro de agua, puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$0,035 \times \text{peso medio de los animales (kg)}$$

----- = g de Termolab/l de agua/12 h
consumo medio de agua cada 12 h (litros)

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 1 día.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA

Su uso no está recomendado durante la gestación o la lactancia.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en caso de hipersensibilidad a los salicilatos o a otros AINEs
- No usar en animales con:
 - Úlceras o hemorragias gastrointestinales.
 - Problemas de coagulación sanguínea.
 - Insuficiencia hepática o renal.
- No usar en animales en tratamiento con anticoagulantes, en lechones con menos de 1 mes de edad o en cerdas en gestación o lactación.
- No usar las 2 semanas anteriores a una operación quirúrgica.

PRECAUCIONES DE USO

Durante el tratamiento debe asegurarse que el agua medicada sea la única fuente de bebida. Renovar el agua medicada cada 12 horas.

No deben excederse la dosis ni el tiempo de tratamiento recomendado.

REACCIONES ADVERSAS

- Pueden aparecer distintas reacciones adversas, sobre todo con tratamientos prolongados a dosis altas, tales como alteraciones gastrointestinales, disminución de la agregación plaquetaria o hemorragias digestivas.
- El empleo en animales muy jóvenes, puede implicar riesgos adicionales. Si no se puede evitar su uso en estos animales, deberá realizarse un cuidadoso seguimiento clínico.
- En caso de que se produzcan reacciones adversas, dejar de administrar el medicamento y consultar al veterinario.

INTERACCIONES

- No deben usarse otros antiinflamatorios no esteroideos simultáneamente con Termolab ni en el plazo de 24 horas tras la última administración del medicamento, debido a que podría producirse una competencia por la unión a proteínas entre estas sustancias con posibles efectos tóxicos.
- El uso simultáneo de corticosteroides puede potenciar la toxicidad gastrointestinal.
- La administración conjunta con otras sustancias activas con un elevado grado de unión a las proteínas plasmáticas puede conducir a efectos tóxicos al competir con el ácido acetilsalicílico.

SOBREDOSIFICACIÓN

La intoxicación aguda por ácido acetilsalicílico provoca síntomas digestivos (náuseas, vómitos, diarreas), nerviosos (convulsiones seguidas de postración con somnolencia y coma), respiratorios (taquipnea y polipnea), trastornos sanguíneos (aumento del tiempo de coagulación).

El tratamiento de la sobredosis consiste en lavado gástrico y alcalinización de la orina para acelerar la excreción urinaria.

MODO DE CONSERVACIÓN Y PERIODO DE VALIDEZ

Mantener el envase perfectamente cerrado.

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 2 meses.

Periodo de validez después de su disolución o reconstitución según las instrucciones: 12 horas.

PRESENTACIONES

Frascos de 1 y 3 kg.

Bolsa de 1 kg.

Bidones de 3 y 10 kg.

Registro nº 3164 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

