

La dihydrostreptomycine  
injectable la plus  
concentrée avec  
enregistrement pour  
porcins du marché



## Estreptolab 250 mg/ml

Streptomycine en solution injectable



### Efficace contre les infections par leptospires

- ✓ 85% des fermes sont positives aux leptospires
- ✓ Un problème grandissant pour les systèmes d'exploitation des reproductrices en enclos
- ✓ Il s'agit d'une **zoonose**

### Évite les portées avec peu de naissances

- ✓ Un des effets néfastes de la leptospirose

### Améliore la fertilité du bétail

- ✓ Administrer aux truies durant le sevrage et aux verrats tous les 6 mois


 **LABIANA**  
*toujours efficace*



## Pathogénie et symptômes de la leptospirose porcine

### INTRODUCTION DE L'INFECTION

- Introduction de primipares et verrats infectés.
- Par d'autres animaux : rats, souris et chiens peuvent servir de réservoir à l'infection.
- Exposition de la ferme à des sources indirectes de contamination, par exemple : eau contaminée, sols en mauvais états permettant la formation de flaques d'urine.



### SYMPTOMATOLOGIE

#### Truies

- Manque d'appétit.
- Fièvre.
- Possible dépression.
- Avortements au troisième trimestre.
- Hausse des porcelets momifiés.
- Hausse des porcelets faibles, non viables.
- Hausse des porcelets prématurés.
- Hausse des porcelets mort-nés.
- Hausse des répétitions chez les truies reproductrices.

#### Animaux en transition et en engraissement

- Ictère aiguë.
- Hémorragie.
- Mort subite.
- Animaux pâles.

### COMPOSITION PAR ML

Dihydrostreptomycine (sulfate) ..... 250 mg

### INDICATIONS

Traitement des infections causées par des souches de *Leptospira* spp. sensibles à la dihydrostreptomycine.

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

1 ml/10 kg p.v. par jour, pendant 3-4 jours par voie IM.

Le poids des animaux doit être déterminé avec la plus grande précision possible afin d'éviter un dosage insuffisant.

Ne pas administrer plus de 7 ml par point d'injection chez les porcins.

Prévoir une distance suffisante entre les points d'injection quand plusieurs endroits d'administration sont nécessaires. Veillez à maintenir une distance minimale de 15 cm entre toutes les injections administrées pour le traitement.

### TEMPS D'ATTENTE

**Porcins :**

**Viande :** 73 jours.

### PRÉCAUTIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la dihydrostreptomycine, à d'autres aminoglycosides et/ou à tout excipient.
- Ne pas utiliser en cas d'insuffisance rénale, d'hépatopathies, de cardiopathies ou de lésions cochléo-vestibulaires.
- Ne pas utiliser chez les animaux de moins d'un mois.
- Ne pas administrer aux femelles en gestation, en raison du risque de toxicité cochléo-vestibulaire fœtale.
- Ne pas associer à l'administration de : antibiotiques bactériostatiques, pentobarbital et anesthésiques gazeux (risque de dépression vasculaire), relaxants musculaires (risque de blocage neuromusculaire) ou diurétiques rénaux (risque d'augmentation de l'ototoxicité).
- Ne pas associer non plus avec : héparine, gluconate de calcium, riboflavine, triamcinolone.

### PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION

Période de validité après ouverture de l'emballage de vente : 28 jours.

### PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml.

Inscription n° 3590 ESP

*Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.*

*Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.*