



Seule formule avec
les vitamines B6 et B12



Feradit

Fer dextran en solution injectable



Pour la prévention et le traitement de l'anémie ferriprive

- ✓ Stimule l'érythropoïèse
- ✓ Stimule l'hématopoïèse
- ✓ Indiqué pour les espèces les plus importantes

Formule améliorée

- ✓ Contient de la vitamine B6 (pyridoxine) pour la synthèse de l'hémoglobine
- ✓ Contient du cuivre pour améliorer le métabolisme du fer
- ✓ Contient de la vitamine B12 et du cobalt qui prévient l'anémie pernicieuse

Efficacité démontrée

- ✓ Introduit depuis plus de 50 ans en Europe



Feradit Fer dextran en solution injectable




Pour lutter contre l'anémie, quelle qu'en soit sa cause

Fer dextran, pour combattre l'anémie ferriprive chez les porcelets

La carence en fer affecte la production de globules rouges.

Si l'anémie initiale n'est pas corrigée et que le déficit en fer perdure dans le temps, des perturbations enzymatiques du métabolisme musculaire et au niveau du système nerveux central surviennent. Après l'injection intramusculaire, le fer dextran est absorbé dans les capillaires et dans le système lymphatique presque intégralement avant 72 heures.

Les cellules du système réticulo-endothélial (macrophages) scindent le complexe en fer et dextran. Le fer s'allie aux protéines pour former de l'hémossidérine et de la ferritine qui sont les formes physiologiques du fer chargées de rétablir l'hémoglobine et les réserves de fer.



COMPOSITION PAR ML

Fer (sous forme complexe fer dextran).....	100 mg
Chlorure de cuivre	2 mg
Chlorure de cobalt	10 µg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine)	6 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)	25 µg

INDICATIONS

Pour la prévention et traitement de l'anémie ferriprive chez les porcelets.
En général, l'anémie chez les animaux domestiques, quelle qu'en soit la cause.

POSOLOGIE

Traitement préventif :

Veaux et poulains : 3 ml au septième jour de vie.

Agneaux : 1 ml au septième jour de vie.

Traitement curatif :

Veaux et poulains : 5 ml par animal.

Agneaux : 2 ml par animal.

Une demi-dose peut être administrée 8 jours plus tard.

Voie intramusculaire profonde.

TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : zéro jour.

UTILISATION DURANT LA GESTATION ET L'ALLAITEMENT

Peut être utilisé pendant la gestation et l'allaitement.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer aux animaux atteints de :

- Hypersensibilité connue au fer dextran.
- Anémie infectieuse.
- Carence en vitamine E et/ou en sélénium (peut entraîner la mort).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Il est recommandé de tirer sur la peau au point d'injection pour minimiser les pertes après retrait de l'aiguille.

Respecter les règles d'asepsie et éviter tout risque de contamination durant l'utilisation.

INTERACTIONS

Ne pas associer à l'administration de préparations orales de fer.

MODE DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25 °C.

À l'abri de la lumière.

Conserver dans un endroit sec.

PRÉSENTATION

Flacon de 100 ml.

Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.

Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.

