



Induction de la mise bas



# Labipituin®

Oxytocine en solution injectable



## Hormone privilégiée en obstétrique

- ✓ Induction de la mise bas
- ✓ En cas d'inertie ou d'atonie de l'utérus
- ✓ Aide à l'expulsion du placenta
- ✓ Provoque l'expulsion d'exsudats en cas de pyométrite et d'endométrite

## Action sur l'allaitement

- ✓ Mise en route de l'allaitement après la mise bas
- ✓ Indiqué en complément pour les traitements de mammites afin de faciliter le drainage

**LABIANA**  
*toujours efficace*

# Labipituin<sup>®</sup> Oxytocine en solution injectable



**L'oxytocine stimule sélectivement l'activité motrice de l'utérus et des cellules myoépithéliales mammaires**

Cellules neurosécrétrices  
Hypophyse antérieure  
Hypothalamus  
Hypophyse postérieure  
Oxytocine

## COMPOSITION PAR ML

Oxytocine ..... 10 UI

## INDICATIONS

### Vaches :

- Induction de la mise bas.
- Inertie ou atonie utérine.
- Involution de l'utérus suite à des césariennes et diminution des hémorragies.
- Expulsion du placenta et des restes d'exsudats après la mise bas.
- Mise en route de l'allaitement après la mise bas.
- Pyométrite et endométrite chroniques pour provoquer l'expulsion d'exsudats.
- Traitement complémentaire à la thérapie antibiotique de la mammite aiguë et chronique pour provoquer l'expulsion de résidus et faciliter le drainage.

## POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

**Obstétrique** (voies intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée) :

- **Vaches** : 75-100 UI (équivalent à 7,5-10 ml).

**Éjection du lait** (de préférence voie intraveineuse) :

- **Vaches** : 10-20 UI (équivalent à 1-2 ml).

L'administration peut être renouvelée toutes les 30 minutes, si le vétérinaire l'estime nécessaire.

## TEMPS D'ATTENTE

**Viande** : zéro jour.

**Lait** : zéro jour.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à la substance active ou à tout excipient.
- Dystocie en raison de présentation anormale, disproportion foeto-pelvienne ou tout autre type d'obstruction mécanique.
- Maladies cardiovasculaires.
- Femelles avec prédisposition aux ruptures utérines.
- En cas de non-dilatation du col de l'utérus (au cours de l'induction de la mise bas).

## PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES D'UTILISATION

L'injection intraveineuse doit être lente, et de préférence combinée avec du sérum glucosé ou physiologique.

Administer avec précaution en cas de toxémies. Des réactions allergiques peuvent survenir.

Ne pas utiliser chez les femelles en gestation jusqu'au moment de la mise bas.

Les corticoïdes, vasoconstricteurs sympathomimétiques et anesthésiques peuvent renforcer ses effets, ainsi que le calcium, les œstrogènes et les prostaglandines.

## PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION

Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). À l'abri de la lumière.

## PRÉSENTATIONS

Flacons de 25, 100 et 250 ml.

Inscription n° 585 ESP

*Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.*

*Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.*

