



Seule néostigmine  
injectable sur le marché



# Rumintral

Néostigmine en solution injectable



## Produit privilégié en cas de tympanisme et atonie gastro-intestinale

- ✓ Traitement de la surcharge ruminale, atonie gastro-intestinale et symptômes de météorisme
- ✓ Produit des effets sur l'appareil respiratoire, en augmentant l'activité ciliaire et les sécrétions bronchiques

## Indispensable dans la trousse du vétérinaire


- ✓ Efficacité maximale en traitements combinés avec Rumilab®

 **LABIANA**  
*toujours efficace*

# **Rumintral** Néostigmine en solution injectable



## Mécanisme d'action de la néostigmine



### COMPOSITION PAR ML

Méthylsulfate de néostigmine ..... 1,5 mg

### INDICATIONS

#### Bovins :

- Atonie du rumen.
- Atonie de l'intestin.

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

0,022 mg/kg p.v. (équivalent à 0,15 ml/10 kg p.v. de Rumintral) par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

### TEMPS D'ATTENTE

**Viande :** Zéro jour.

**Lait :** Zéro jour.

### UTILISATION DURANT LA GESTATION ET L'ALLAITEMENT

Ne pas administrer aux femelles en gestation ou allaitantes.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas administrer en cas d'obstruction mécanique de l'appareil gastro-intestinal ou urinaire.
- Ne pas associer à l'administration d'autres inhibiteurs du cholinestérase, ou de bloquants neuromusculaires dépolarisants (succinylcholine).

### EFFETS SECONDAIRES

Effets correspondants à l'hypoactivité cholinergique.

### SURDOSAGE

Faiblesse musculaire prononcée, vomissements, coliques, diarrhée, myosis, dyspnée, bradycardie, hypotension. La mort est entraînée par insuffisance respiratoire.

**Antidote :** Atropine.

### PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

### PRÉSENTATION

Flacon de 25 ml.

Inscription n° 891 ESP

*Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.*

*Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.*

