



Seule néostigmine
injectable sur le marché



Rumintral

Néostigmine en solution injectable



Produit privilégié en cas de tympanisme et atonie gastro-intestinale

- ✓ Traitement de la surcharge ruminale, atonie gastro-intestinale et symptômes de météorisme
- ✓ Produit des effets sur l'appareil respiratoire, en augmentant l'activité ciliaire et les sécrétions bronchiques

Indispensable dans la trousse du vétérinaire


- ✓ Efficacité maximale pour le contrôle de l'atonie intestinale.

LABIANA
toujours efficace

Rumintral Néostigmine en solution injectable



Mécanisme d'action de la néostigmine



COMPOSITION PAR ML

Méthylsulfate de néostigmine 1,5 mg

INDICATIONS

Ovins et caprins :

- Atonie du rumen.
- Atonie de l'intestin.

Chevaux:

- Atonie de l'intestin.
- Atonie vésicale.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

0,22 mg/kg p.v. (équivalent à 0,15 ml/10 kg p.v. de Rumintral) par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

TEMPS D'ATTENTE

Viande : Zéro jour.

Lait : Zéro jour.

UTILISATION DURANT LA GESTATION ET L'ALLAITEMENT

Ne pas administrer aux femelles en gestation ou allaitantes.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas administrer en cas d'obstruction mécanique de l'appareil gastro-intestinal ou urinaire.

Ne pas associer à l'administration d'autres inhibiteurs du cholinestérase, ou de bloquants neuromusculaires dépolarisants (succinylcholine).

EFFETS SECONDAIRES

Effets correspondants à l'hypoactivité cholinergique.

SURDOSAGE

Faiblesse musculaire prononcée, vomissements, coliques, diarrhée, myosis, dyspnée, bradycardie, hypotension. La mort est entraînée par insuffisance respiratoire.

Antidote : Atropine.

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

PRÉSENTATION

Flacon de 25 ml.

Inscription n° 891 ESP

Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.

Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.

